

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之三目錄

宋燕山竇漢卿撰著

明三衢大酉堂補梓

肺疽肺癰圖說方一井疽發圖說方一穿心冷瘡圖說方一

胃癰圖說方二心肝癰圖說方一血疳瘡圖說方一

蜂窠發胸圖說方一九發圖說肚癰圖說方一

氣毒流注圖說方二臍癰圖說方一小腸癰圖說方十

盤腸癰圖說方二發壯毒圖說方三臍癰毒圖說方一

肋壯毒圖說方一乳癰圖說方一乳發圖說方三

妳癰圖說

方二

妳癰圖說

方二

乳巖圖說

方二

風毒遍身串圖

方一

火腰帶毒圖

方二

內丹圖說

方一

肩疽并丫疽圖

方一

上下肋癰圖

方二

訓疽燔疽圖

說方十

肘後癰圖說

方二

左腋疽圖說

方四

右腋疽圖說

方六

筋疽圖說

中發疽丫刺毒

天蛇毒圖

說方六

肩疽圖說

方二

背面毒圖說

方二

第三卷目錄畢

重校宋寶太師瘡瘍經驗全書卷之三

圖論方
肺疽



此毒因暑熱炎天受其穢氣并伏熱毒之氣故生此疽
在皮膚之間或生遍身形如木鱉子大如雞頭大若不
速治毒氣入囊即死內服敗毒散加猪苓澤瀉當歸黃
芪桔梗天花粉荆芥連翹外用圍藥敷之

升麻湯 治肺癰肺疽胸乳間皆痛口吐膿血作臭

升麻

桔梗

薏苡仁

地榆

黃芩

赤芍

牡丹皮

生甘草

黃芪

貝母

水煎服

虛甚加人參白朮

多服護心散

蠟礬丸

牛黃清心丸

肺癰



夫肺者五藏之華蓋也此癰因內外兩感風寒所傷及憂思愁慮形寒飲冷以傷肺經遂致成癰身發寒熱兩肢脇腋俱痛口吐膿臭日夜無度喘嗽胸膈喘滿兼脹睡卧不安已破入風者不治急服枳朮桔梗湯

并升麻湯 十六味消化飲 黃礬丸 各進三五服
夜服牛黃清心丸 更有乳香萬應膏貼之

參芪大補湯 節勞戒氣忌酒絕慾已破收斂瘡口合
歡皮白鯁二味咬咀每服五錢水煎溫服合歡皮即黃
芪皮也

桔梗湯

桔梗 貝母 當歸 枳殼 防風 苡仁 公葵仁

桑皮 蜜炙各一錢 黃芩 二兩伍錢 杏仁 百合

甘草節 各五分 薑三片煎服

欬花湯 嗽而胸痛振寒脉數咽乾大渴時出濁唾腥

臭臭久吐膿如粳米粥狀者乃為肺癰

欬花 去梗一兩五錢 甘草 一兩多 桔梗 二兩 薏苡仁 一兩

右作十劑水煎服

內癰有膿敗血腥穢殊甚遂致臍腹冷痛此乃敗膿

所致以此推下

膿血

白芷

四兩

白芍

一兩

枯礬

一兩

單葉紅蜀葵根

八分如無以
綠葉代之

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九清米湯空

心下其膿漸出生肌

井頭發



此症發于胸者名曰井疽狀如豆大二四日起若不早
治必入于腹入腹不療十日當死急服內固清心散可
治若內發傷膜主死無疑治法與發胸發背同
保內清心散

粉草

升麻

當歸

川芎

黃芪

芍藥

山梔

乳香

黃芩

羌活

桔梗

天花粉

青皮

白芷

水煎服

即服護心散嘔藥丸

務要戒怒

圍藥同前

穿心冷瘻



此毒生于心窩初起則心頭如火熱其毒先內潰心胞

方出皮膚令人心神恍惚盜汗多出二日皆紅舌如雞
金背裏外俱熱易治若毒發于外冷氣攻心常嘔吐惡
心口吐冷氣惡聞食味然氣臭者死治方于後

辰砂 茯神 遠志 茯苓 人參 乳香 沉香

丁香 木香 藿香 射香 酸棗仁

各等分末之入辰砂末二錢金箔五片全研細燈心
薄荷湯下

內塞散 治穿心冷瘰

人參 白朮 白茯苓 熟地 甘草 芍藥 黃芪

肉桂

當歸

黃芩

酒炒桔梗

防風

水煎服連服十貼次服黃禁丸護心散常服

試治法

乾薑為末鷄子清調付如潰爛洗淨瘡口拭乾搽末
覺熱如烘生肌易愈

六合回生丹 有回生之妙

真鉛粉

兩輕粉

銀珠

雄黃

乳香

黃上

沒藥

同前各二分五厘共一兩一錢二分五厘

右六味各擇真正好者研為極細末凡治其病先用

好苦茶洗淨瘡口軟絹拭乾后剖猪腰子片用藥一
二分搽腰上却付患上待腰子發熱如蒸良久取去
自此拔去毒氣定減痛苦瘡口出膿不可手擠第二
日依前法再付之第三日亦付之惡甚可傳七八九
次瘡小只傳一次可愈猪腰子不發熱勿治矣

治痛心背前有孔久不愈即漏也胃癰并疽心肝癰心
瘻之類

鹿茸

去毛酥炙黃

附子

炮去皮

藍花

即好

右三味各等分為末

用棗肉去皮核為丸每服三十九空心酒下治腰床

胃瘧



素問云人病胃脘瘧當候胃脉脉沉細者氣逆氣逆者

人迎甚盛則熱人迎者胃脉逆而盛熱聚胃口不行故胃為瘡其發寒熱如瘡身皮甲錯或嗽或嘔或吐膿血連翹升麻湯 熱聚胃脘留結為瘡須要知戒

沉香

另

乳香

另

生甘草

青木香

各三錢

連翹

射干

升麻

羌活

桑寄生

木通

各七錢五分

大黃

飯上蒸三兩

射香

二錢

右作十劑每劑以粗藥水煎去

粗入五香細末溫服以利為度能折其熱毒之氣

犀角湯

犀角

梔子仁

赤茯苓

赤芍藥

射干


黃芩

大黃

炒熟各二錢

水煎去粗入蜜再煎溫服

心肝癰



心者君主之官神明出焉肝者將軍之官謀慮出焉二

官有君臣之分一身之主宰其可傷也此癰受在心心
主行血氣血熱傷于經絡此是惡毒之症不可不審也
常用定痛敗毒散如不散用內托流氣飲

定痛敗毒散

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

烏藥

茯苓

防風

白芷

香附

白芍

羌活

人參

前胡

薑三片棗一枚灯心甘藍煎服

內托流氣飲

人參

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

枳殼

白芍

當歸

防風

烏藥


白芷

川芎

薑三棗一食前服

腹痛加沒藥玄胡索

血疳瘡



夫血疳者臟中虛弱邪氣相侵真氣衰少風毒閉塞腠

理發于肌膚初如紫疥破時出血瘡生遍身行處成瘡
損傷皮肉痒痛難存治法先服當歸連翹散並服清肌
滲濕湯并搽十神散

清肌滲濕湯

歸瀕

酒洗

白芷

甘草

升麻

蒼朮

白朮

土炒

川芎

白芍

酒炒

連翹

山梔

酒炒

黃連

酒炒

黃柏

酒炒

知母

同上

木通

青皮

木瓜

澤瀉

茯苓

苦參

酒炒

枳殼

柴胡

石菖蒲

煎服治法亦同紫疥

終策發胸



此症蜂窠發于胸乳間乃心火熱盛須用依前疎導心
火之藥稍治之遲則熱必攻心必然死矣

煎藥

人參 黃芪 白朮 茯苓 甘草 金銀花

連翹 生地 白芍 山梔 黃芩 天花粉


桔梗 防風 青皮 乾葛 麥冬 鼠粘子

冬天加官桂 夏天加黃柏 雨天加澤瀉

先貼膏藥 后用搽藥方具于前

洗用猪蹄湯

九發



關丹京堀

田門

此症發為肺疽心疽肝疽腎疽脾疽胃疽大腸疽三焦
疽小腸疽右驗其所膜依擬此候審定瘰疽淺深其
病從何臟腑發先曾食何乳石又驗其氣血虛實穿潰
出外者可治發于內者則傷膜流膿大便出者必難治
若以藥會膿大便出者則藥味入于經絡引出無害當
泰詳而療之

參芪內托散具前愈後一年之外不許遠行及行房事
若不知戒終至于斃

圖藥同前

膽
膽



此症生于臍內因食冷滯油膩之物積聚于氣海之間聚結成瘻若不速治即內潰臍肉出膿四圍堅硬或出此血水者即難治也無此即生

用內托散加 猪苓 澤瀉 歸頭 黃柏 車前子

知母 膿盡多加 白朮 黃芪 熟地 山藥

多服蠟磬丸

如未潰破按之有膿將治腸肚瘻行藥從大便中出甚妙方亦同

痛加乳香

小腸癰



此症因膀胱有熱畜毒不流結成此毒以致臍中堅硬
結核小便疼痛日夜下利無度治方于後
用服敗毒散加

猪苓 澤瀉 木通 燈草 甘草稍 瞿麥

又用連根葱十根搗爛盒臍上多服金花丸
用前腸癰壯癰之法治之

即盤膠鹽
用腕疔後方



此毒因閃胸而得之用獨活散
此即治腕疽藥

羌活 獨活 烏藥 茯苓 荊芥 當歸 川芎

桔梗 白朮 黃芪 升麻 貝母 枳殼 知母

黃栢 人參 再用前肚癰之法治之

會膿在大便中出法開后

大黃 三錢 薑黃 二錢 赤石脂 二錢 穿山甲 炮一錢五分


白芷 一錢 髮灰 一錢 巴豆 研細 不去油 一粒 臨服和藥內

右為末老酒早辰空心調服

行利十餘次用薄粥補之如瀉不止飲漸汲井水三

酒盃其瀉立止須要服參芪膏大補之

發肚毒




發肚之毒有發腹肚或手肚足肚者俱為發肚若不速
治必致喪命便服蠲毒流氣飲三四服并服六皮四子
湯

內托散加 木瓜 檳榔 蒼朮 空心煎服
未潰用金箍散

已潰后外貼金絲膏 服蠟丸
六皮四子湯

陳皮 青皮 腹皮 加皮 薑皮 茯苓皮 五花粉
蘇子 茴子 甘草 葶藶子 車前子

肥
瘠



此毒生于脾經因食煎燂油膩酒醉太過及行房事以致毒不流通聚成此瘰或生在外或生在内若不速治潰透脾膜即死用此方服之

厚朴 砂仁 半夏 陳皮 茯苓 人參 青皮
為藥 木香 枳殼 甘草 甜瓜 黃芪 白朮
次服內補十宣散 蠟礬丸

潰后久不愈用前六合回生丹猪腰子法治之
未潰爛之前按内有膿狀急用腸痧之行藥追膿大
便中出庶易愈矣

肋肚癰



此癰受在大小腸二經氣癰發出在表此乃結癰聚毒也當用內托流氣飲

人參 木香 黃芪 厚朴 甘草 紫蘇 桔梗

枳殼 官桂 檳榔 烏藥 當歸 芍藥 白芷

川芎 防風 天花粉

薑三片棗一枚用水煎服

外用圍藥 內服腸癰從大便會膿之藥治之調理禁忌之法相同

氣毒源注



此症因喜怒不常飲食失節氣上停食或因負重努力

傷其經絡故生此疾便服蠲毒流氣飲 內托千金散

黃礬丸 護心丹 此症乃乘虛感風濕熱相結而成

初生一二漸至于多及有廿三五者遍體皆生先發汗

以解風濕次用參芪之劑補之圍藥薑汁醋調有方在

取汗流氣飲 川芎 白芷 升麻 甘草 當歸

羌活 獨活 烏藥 木香 紫蘇 防風 荊芥

蒼朮 厚朴 肉桂 麻黃 黃芩 桔梗 大柴胡

白芍

水二鍾姜五蔥三煎熱服以衣覆身出汗為妙如無汗而服次鍾有汗不必服止可一劑

次服內托千金散大加參芪 霖雨加蒼朮澤瀉

腳癰毒



此癰受在心流于小腸經發在臍中堅硬如石與男子
不同此是惡毒症也當用內托流氣飲定痛三香飲治
之治法須用圍藥并同男子臍癰之藥加減治之
定痛三香飲

乳香

香附

木香

延胡索

人參

黃芪

當歸

川芎

芍藥

防風

官桂

甘草

枳殼

桔梗

烏藥

厚朴

白芷

夏天去桂加乾葛黃芩生地麥冬

薑三片棗一枚煎服

乳癰



乳房屬陽明經乳頭屬厥陰經此毒因驚憂鬱結乳間成瘰初起二三日即用鹿角散

鹿角

乳牛角

穿山甲

燒過三味為末好酒調服

外用金箍散蜜水調付若不能痊急用荆防敗毒散加瓜蒌子 天花粉 水二鍾煎服若五七日不散服內托散加 白芨 金銀花

外吹乳者小兒吮乳吹風在內故也內吹乳者女人腹中有孕其胎兒轉動吹風在外故也煎藥中須用保胎之劑以治乳發之藥同煎之

乳發



皂角散治乳癰及乳疼皂角一條蛤粉三錢乳香錢一末之

酒調下以手揉乳令散 外用金箍散敷之

內服復元通氣散木香 青皮 白芷 貝母 金銀花

陳皮 穿甲炮紫蘇 當歸 川芎 連翹 甘草節

木通 瓜蒌仁 已潰者用人參黃芪貝母白朮類之

治發乳癰疽一切腫毒 石膏 青皮 陳皮 穿山甲炙

當歸 木香 人參 麻黃 白芷 甘草 乳香

沒藥 川芎碎 漏芦 枳殼 貝母共為細末酒調服或剉水煎酒服亦可

又方白芷貝母各半為末酒調下錢二日三次如乳不下加

漏芦 乳疼洗法牡蠣煅五倍紅枯二錢水二碗煎洗

妳癰



此疾因女子十五六歲經脉將行或一月二次或過月

不行致生此疾多生寡薄氣體虛弱宜服敗毒散加地黃再服黃凡九其毒自然而散不致損命每乳上只有一箇核可治若串成三四箇即難療也治法逍遙調經湯開鬱順氣解毒湯加減用之

開鬱順氣解毒湯

青皮 柴胡

當歸 香附

甘草 陳皮

撫芎 枳仁

生地 赤芍

連翹 烏藥

砂仁 黃芩

桔梗 羌活

天花粉 金銀花

冬天加桂玄胡索

再用夏枯草四兩水三四碗砂礮煎服

逍遙調經湯

當歸 川芎

生地 熟地

白芍 香附

陳皮 甘草

丹皮 澤蘭

烏藥 黃芩

青皮 枳殼

玄胡索 小柴胡

煎服

姝
癖



此疾乃五六十歲年老之人生此疾症不成膿結毒莫
用涼劑付貼若使涼藥付貼即毒入肺腑即死用鹿角
散相和黃礬丸頻頻服之以好為度

開鬱順氣解毒湯方在前

千金托裡散

乳岩已嫁未嫁皆生



此毒陰極陽衰柰虛陽積而與血無陽安能散故此血

滲于心經即生此疾若未破可療已破即難治捻之內
如山岩故名之早治得生若不治內潰肉爛見五臟死
未破用蠲毒流氣飲加 紅花 蘇木 生地 熟地
青皮 撫芎 烏藥 甘草 小柴 瓜蒌仁
又方

撫芎 柴胡 青皮 香附_{各二兩} 甘草 玄胡索

陳皮 桔梗 黃芩 梔仁 枳殼 天花粉

烏藥 白芷 貝母_{各二兩} 砂仁_{二兩} 蔓荊子_{炒一兩}

在為末水丸每服二錢日進三四服作煎劑服之亦可

風毒遍身串




此毒生於皮膚之間因中暑毒或食火牛火馬瘟猪等物以生此疽雖見勢克亦易治忌食生冷毒入臟腑難治先服流氣飲次服人參敗毒散加

猪苓 澤瀉 當歸 防風 外用圍藥

次服蠟丸

用前醫流注取汗流氣飲治之甚宜

火腰帶毒



火腰帶毒受在心肝二經熱毒傷心流滯於膀胱不行

癰在皮膚此是風毒也常用清肝流氣飲敗毒和氣散
治之不可便敷藥清肝流氣飲亦宜

桔梗 甘草 防風 前胡 羌活 獨活 赤芍

連翹 薄荷 荆芥 石膏 枳殼 黃連 白茯苓

歸須 青皮 黃芩 煎服之


敗毒流氣飲 紫蘇 桔梗 枳殼 防風 柴胡

甘草 川芎 白芷 芍藥 當歸 羌活 茯苓

烏藥 陳皮 薑三棗一煎服

患上用紫金錠水磨汁頻用鷲毛蘸汁潤之

五



內外者從脇下至腰下腫發赤色名曰內丹如早瘡可
治至腰便不可治其病多大小便不通似有不過三日
而飛遍身青黑色而死用救急丹醋磨付內丹處更服
連翹敗毒散

當歸

連翹

黃芩

甘草

麥冬

木通

柴胡

前胡

黃連

生地

薑二片棗一枚水二鍾煎服

肩疽并丫疽



病有疽者因負重傷動肩井穴故生此疽用內托散加
烏藥 青木香 外貼金絲膏

又疽因空心于宿水內洗手恐水中有虫遊過染其穢
毒以生此疾急用鉄箍散暗醋調和厚付患處却服敗
毒內托散神思昏迷色紫氣臭者難治

上下肋癰



上下肋癰受在肝經寒熱不調風濕伏於腸胃結成癰

毒發出皮膚生此惡症當用敗毒流氣散後服內托流氣飲

敗毒流氣散

紫蘇 桔梗 枳殼 甘草 芍藥 烏藥 厚朴

青皮 茯苓 陳皮 柴胡 玄胡索姜三棗一不
拘時服


後用內托流氣飲

人參 木香 黃芪 厚朴 甘草 紫蘇 桔梗

枳殼 官桂 烏藥 當歸 白芍 防風 白芷

川芎 茯苓 陳皮 天花粉 薑三棗一煎服

訓
名
標
痘



訓疽者肺經受熱發于兩手五指頭上一八日不瀉必死四日可刺如發黑癰不甚過節猶可治也黑甚過節者死雖過節猶可治者藥入及之也其狀因小黯肉中生點子點小者如粟豆大惟大者如梅李或赤或黑乍青乍白有實核即根也不浮腫慘痛應心至骨或身體發熱若不急治毒遂冲上面惡腫泡點紫黑爛壞入藏殺人南人得此名曰榻着毒即截去其指恐毒攻上罕有一生十指端忽然策策痛入于心不可忍之向明望者是見黃赤或黯青黑是燦疽齒間出臭水血者七日

亡矣但厚肉處即割去用炮鉄烙炮上令焦如炭亦如
疽上灸百壯為佳須頻飲葵根汁青葙花竹瀝犀角汁
枳殼湯消毒飲若吐膿血不治宜以灰掩膿血上不爾
毒氣着人亦相染矣癰疽害人不旋踵惡風入肌脉初
未知蒼毒鬱既發若火之烈其上隱小而深實點黑而
不明其病應心稍緩則入臟矣
枳殼湯

枳殼 射干 升麻 生地 黃芩 前胡 金銀花
連翹 大黃 炒甘草 犀角 另磨汁臨服加之

水二鍾煎日三服

消毒散 瘰疽熾甚十指舉赤痛而痒

梨芦 大黃炒 黃柏 黃連 甘草 各一兩

水一斗文武火煮一升漉淨淋洗患處

皂角散

潰后用皂角去皮子燒灰為末盥湯洗淨乾付三次
風疽 由風濕之氣入于腠理流注血脈不利拳曲腫
起疼痛經久不瘥蓋風勝則動故其疽留止無常得
之醉卧當風汗出宜用前十六味流氣飲并服黃芪

九

黃芪九 酒醉汗出風入經絡成風疽

黃芪 犀角各三錢 黃連 茯神 當歸 防風 各三錢

甘草三錢 芍藥 升麻 黃芩各三錢 木通八分 射干一分

右為細末拌勻煉蜜丸如桐子大每服二十九空心
生薑湯下食後再服再用麥冬湯調服護心散時用
胆礬乳香末付之大丸此症須剔去甲方愈

又方用烏梅十枚爨斗內炭火燒令通赤去火毒礮極
細末以鹽湯洗淨摻之仍軟帛裹之如瘡急痛即以

酥油塗瘡上

甲疽

足三陰經皆起于足氣血阻滯不行潰于指甲間或剪甲傷肌或長侵肉或屢小不適血氣阻遏不通腐潰久則浸淫爛指然病在四末不必治內惟用搽藥而愈

綠礬丸

綠礬五兩置鉄板上聚炭封之火熾綠礬沸流出沸定汁盡出火待冷為末先以鹽湯洗淨瘡拭乾付末

多付愈佳軟帛紮裹當日即汁斷瘡乾若急痛以酥
令潤每日一遍鹽湯洗有膿處令淨其痂乾處不須
近湯每洗訖付末如初但急痛即塗酥五六日其瘡
上痂漸剥起依前洗付十日餘即瘡漸漸總剥痂落
軟處或更生白膿疱即捺破付藥自然瘥也

甲疽赤肉生甲邊上裹甲用白礬燒令沸定為末付之
濕則再付一日數易即消散矣須先以葱椒湯浸洗
足甲令軟快刀割去甲角入肉處挹乾取藥付之軟
絹裹之半日藥濕則易之瘥后須用寬鞋勿穿窄者

又方

綠礬

煑薑各二錢

射香一分

末之絹袋盛藥納帑

于袋中線扎定以瘡為度

甲疽弩肉膿血疼痛

牡礪厚者生研細末每二錢青散少許酒調下

嵌甲

礪砂

乳香各一錢

韶粉五分

橄欖核三枚燒存性

黃丹

一錢飛過

末之麻油調付先以鹽湯挹乾拭之

代指 芒硝煎湯淋洗方漬

附脚背發此症由于消渴之症發于足指者名曰脫疽
其狀赤紫者死不赤黑者可治宜服苦參丸

苦參丸 專治此發

苦參

四兩酒并炒

羌活

獨活

蔓荊子

茯苓

赤芍

川芎

何首烏

當歸

荊芥

甘草

白芷

防風

白蒺藜

山藥

黃芪

山梔仁

牙皂

川烏

生去皮各三錢
再火炮

酒糊為丸每服二錢或酒或鹽湯下茶清亦可

又方

苦參無名異各半同桐油煎三沸加川椒五錢再煎
瀝淨將桑葉或芭蕉葉浸油內七日貼在瘡上即安
手指發者同前治之

肘后癰乃發背毒也



此發背毒受在心腎經通於五指絡毒氣流走通為串
漏此是惡毒也當用內托流氣飲定痛消毒飲治之此
肘後毒氣血流注積結成毒此乃癰毒也定痛流氣飲
當歸 生地 紫蘇 芍藥 甘草 桔梗 枳殼
烏藥 白芷 羌活 防風 川芎 茯苓 天花粉
消毒流氣飲

木香 當歸 川芎 檳榔 黃芪 芍藥
防風 甘草 厚朴 桔梗 枳殼 烏藥 白芷
薑三棗一煎服

左腋疽



此左疽生於左腋下乳側間因喜怒不常或飲食之間
忽然被驚或忍氣而得之若不速治必成流注
急服千金內托散

蠲毒流氣飲

黃凡丸

外用圍藥鉄箍散或金箍散敷治之

右腋疽



右腋疽生於血堂之間初起一小核日漸長大成疽急服內托散三五貼外用圍藥并服黃九丸再服十奇散三五服方可用針刺破

治法同前

筋疽或生臂撐上者即鵝臈也。



此疽生動脈之間筋寄之上臂膊不能屈伸若不速治
潰爛筋脉必致成疾若生于臂撐上者名鵝癰紅腫作
痛初宜灸之若潰之必損命不可輕忽治方于後

內托散加水香五加皮更服黃九九十奇散護心散
外敷鈇箍散加薑汁調付

多服護心散

中發疽

丫刺毒

天蛇毒



天蛇頭毒

中發疽受在肝經氣血不行壅聚結成毒也當用托裏
流氣飲消毒流氣飲治之

羌活 人參 桔梗 枳殼 甘草 防風 柴胡

黃芩 川芎 獨活 前胡 蟬脫 芍藥 當歸

白芷 右水薑三片棗一枚煎服

托裏流氣飲

人參 黃芪 當歸 川芎 白芍 烏藥 甘草

防風 白芷 厚朴 茯苓 紫蘇 桔梗 青皮

黃芩 右煎法同前

手腕毒



此毒受在掌后因心經風寒喜怒驚風痰盛血不流通
結成此毒當用定痛散毒散內托清氣飲或透手心或

透腕外再用三香內托散治之

定痛敗毒散

白芍

白芷

乳香

末

桔梗

枳殼

防風

當歸

羌活

茯苓

甘草

薄桂

靈仙

木通

金銀花

姜三棗一煎服

夏天加黃芩

內托清氣飲

人參

黃芪

紫蘇

厚朴

川芎

桔梗

金銀花

枳殼

青皮

甘草

防風

天花粉

木香

羌活

當歸

芍藥

煎同煎

天蛇毒受心風傷于指肘背此是惡毒症也當用定痛
流氣飲治之

定痛流氣飲

人參 當歸 蟬脫 黃連 桔梗 防風 甘草

白芷 乳香 青皮 白芍 烏藥 山梔仁

此症未熟不宜便用刀開針撥其弩肉即發起深難治
者

又方 用蜈蚣一條火上炙乾末之猪胆汁調塗時用
胆汁潤之

又方 黑生豆為末將黃梔子殼二枚研末胆汁調塗
一潰後經年不能長肉用二黃散摻之

二黃散

牛黃

真一錢

雄黃

二錢

冰片

一分

右為細末乾摻須要戒房勞湯火風氣之類

有疽



有疽受在腎膀胱氣血凝滯不行結成疽毒也先用流
氣飲內托飲四圍以圍藥敷之
多服消毒散

人參 紫蘇 前胡 川芎 黃芩 桔梗 羌活
獨活 枳殼 茯苓 甘草 防風 赤芍 煎服
內托定痛散

人參 黃芪 地黃 白芷 川芎 赤芍 防風
赤茯苓 甘草 烏藥 桂心 枳殼 桔梗 木香
薑三棗一不拘時服 與有疽藥同

背而毒



此背面毒爲人在肝肺經氣血凝滯不通結聚成毒此是

惡症也當用清毒流氣飲

紫蘇 桔梗 枳殼 甘草 烏藥 白芷 腹皮

黃芩 當歸 芍藥 川芎 防風 羌活 柴胡

白芍 連翹 姜三棗一煎服

后用定痛內托飲

人參 當歸 芍藥 厚朴 桔梗 川芎 甘草

防風 白芷 黃芪 茯苓 羌活 烏藥 官桂

紫蘇 香附 右煎法同前

園藥用金箍散敷之

瘡瘍經驗全書卷之三 畢